

指 導 教 授 氏 名	指 導 役 割
印	
印	
印	

## 学 位 論 文 要 旨

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

専攻分野 歯科矯正学	身分 大学院生	氏名 出射 明美
論文題名 機械的伸展刺激がヒト歯肉線維芽細胞と共培養したヒト iPS 細胞由来心筋細胞の成熟に与える影響		
論文内容の要旨（2000字程度）		
<p><b>【緒言】</b></p> <p>iPS (induced Pluripotent Stem) 細胞を用いた再生医療は近年多様な分野で研究が進み、一部では既に臨床応用されている。心臓移植は、末期心不全に対する唯一の治療法であるが、本邦ではドナーの不足が問題となっており、心臓移植の適応がありながら亡くなる人が後を絶たない。iPS 細胞から心臓を作製することが可能となると、この移植待機の問題が一気に解決し得る。iPS 細胞から心筋組織への分化誘導は様々な方法が考案されてきたものの、現状では大量の心筋組織を得ることは困難であり、分化誘導効率は重要な課題となっている。過去の研究では、歯肉線維芽細胞 (human gingival fibroblast, HGF) が iPS 細胞の分化誘導を促進することが報告されている。また機械的伸展刺激により iPS 細胞由来の心筋組織の成熟が促進することも報告されている。そこで本研究では、iPS 細胞から心筋組織への分化誘導効率、及び得られる心筋組織の成熟度の向上を目標とし、iPS 細胞と HGF との共培養条件下で機械的伸展刺激を与えることで、iPS-CMs の分化効率の促進、成熟度の向上が得られるとの仮説を立て、これを検証した。</p> <p><b>【材料ならびに方法】</b></p> <p>HGF は、岡山大学病院矯正歯科治療中の患者の智歯抜去を行う際に採取した健常な歯肉組織から単離した。HGF とヒト iPS 細胞 (201B7 型) を播種し、心筋細胞への分化誘導を行った。心筋組織への分化誘導中に機械的伸展刺激を加えるため、全てのサンプルはストレッチチャンバーを用いて培養した。分化誘導開始 15 日目から 72 時間、機械的伸展刺激を与えた。これをストレッチ群とし、伸展刺激を与えないものをコントロール群として両群を比較した。定量性 RT-PCR および蛍光免疫組織染色にて心筋組織への成熟度を評価した。また細胞内構造を観察するため、電子顕微鏡による観察を行った。iPS-CMs の自発的収縮を撮影した動画を解析し、収縮能を定量化した。さらに機械的伸展刺激前後での収縮能の変化率を両群で比較した。</p> <p><b>【結果および考察】</b></p> <p>定量性 RT-PCR の結果より、伸展刺激開始 72 時間後の 18 日目において、心筋マーカーである cTnT の発現量はコントロール群と比べ、ストレッチ群で有意に増加していた。また未分化度の指標となる多能性マーカーの Oct4、Sox2 の発現量は、両群において継時的に減少した。このことから、機械的</p>		

より詳細に細胞内構造を観察するために、電子顕微鏡による観察を行ったところ、両群においてサルコメア構造の配列が認められた。健康で成熟した心筋細胞内線維の配列は整っていることが知られており、心筋細胞内線維の配列の変化が、心筋組織の拍動に影響を及ぼすことが報告されている。したがって、協調性の高い拍動を示す心筋組織を作製する上で、心筋細胞内線維の配列は非常に重要であると言える。両群のサルコメア長を比較したところ、コントロール群が  $1.164 \pm 0.158 \mu\text{m}$  であるのに対し、ストレッチ群は  $1.586 \pm 0.194 \mu\text{m}$  と有意に大きい値を示した。ヒト成熟心筋のサルコメア長は  $1.6 \sim 2.2 \mu\text{m}$  とされており、ストレッチ群の方がこれに近い大きさを呈していた。またストレッチ群において、暗帯と明帯を有するサルコメア構造が確認でき、より成熟心筋に近い構造を呈していた。したがって、機械的伸展刺激によってサルコメア構造がより成熟したことが分かった。

iPS-CMs の自発的収縮を記録した動画を解析し、ストレッチ前後における収縮能の変化をベクトル場として可視化したところ、ストレッチ群において、収縮能が増大している傾向が見られた。収縮能を数値化して比較したところ、コントロール群において、1/4 において収縮能の低下が認められ、他の 1/4 は変化がほぼ認められなかった。一方で、収縮能が大きく増大したものもあり、コントロール群の中でサンプルによってばらつきが大きかった。また、ストレッチ群においては収縮能が低下したサンプルはなく、平均的には安定した収縮能の増大が認められた。このことから、心筋組織分化誘導中に機械的伸展刺激を与えることで、収縮能の向上が得られることが示唆された。

#### 【結論】

HGF との共培養条件下で iPS 細胞の心筋分化誘導中において機械的伸展刺激を与えることで、iPS-CMs の成熟度の向上、分化効率の促進が示唆された。